

如何預防子宮頸癌發生？



● 子宮頸抹片檢查

30歲以上婦女每三年應至少接受一次子宮頸抹片檢查，早期發現子宮頸癌前病變，予以治療，進而阻斷後續發展為侵襲癌。不過，任何一項篩檢都會有偽陰性個案發生，所以即使抹片檢查結果正常，有任何異狀時均應儘速就醫。

● 人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)


目前上市的疫苗可以預防因人類乳突病毒第16、18型感染所引起的子宮頸癌，可接種年齡為9-26歲婦女。由於疫苗只能預防60-70%的子宮頸癌，所以接種後仍應定期接受子宮頸抹片檢查。已有過性行為的婦女仍可接種，但無法預防已感染型別所引起之疾病發生。

如何預防子宮頸癌發生？




● 保險套

理論上戴保險套應可以預防部分人類乳突病毒傳染，但由於人類乳突病毒只要有性接觸不一定要性交即可能傳染，因此部分研究顯示戴保險套不能完全預防人類乳突病毒傳染，但可能可以降低子宮頸癌的發生，因此建議性行為時仍應戴保險套。



衛生署國民健康局 關心您



認識

人類乳突病毒
及子宮頸癌



什麼是子宮頸癌？

子宮頸就是連接子宮及陰道的地方，子宮頸癌即是指這裡產生的癌變。

在台灣，子宮頸癌是婦女癌症發生率及死亡率的第五位，每年約有2000名新發生個案，並導致近900名婦女死亡，是婦女不可輕忽的疾病。

為什麼會發生子宮頸癌？

絕大部分子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所致，感染後多會自行痊癒，僅有少部分持續感染者，會於日後發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。

什麼是人類乳突病毒？

目前已知約有40種人類乳突病毒型會感染肛門及生殖區的皮膚及黏膜，而與子宮頸癌相關的高危險型別約有17種，其中第16、18、52、58等型別為台灣較常見的高危險型別，而引起尖型濕疣(俗稱菜花)的第6、11型屬於低危險型別。

目前尚無藥物可以治療人類乳突病毒感染，但對於子宮頸癌和尖型濕疣，可以施以局部治療。

人類乳突病毒感染很常見嗎？

有性經驗的婦女感染人類乳突病毒很常見，根據調查，一般健康婦女人類乳突病毒感染盛行率約在9~20%，推估婦女終其一生約有50%的機會感染人類乳突病毒。

